

Ihre Erinnerungskarte für die Blutuntersuchungs- termine

BITTE BEACHTEN SIE

Wenn Sie Agomelatin einnehmen, ist es wichtig, dass Sie regelmäßig Blutuntersuchungen durchführen lassen.

Die unten abgebildete Tabelle ist Ihnen behilflich, einen Überblick über die Termine für Ihre Blutuntersuchungen zu haben.

Agomelatin 25 mg - Datum der ersten Einnahme:	
Termine für Leberwertuntersuchungen	Datum
1. Test vor Behandlungsbeginn	
2. Test nach ca. 3 Wochen	
3. Test nach ca. 6 Wochen	
4. Test nach ca. 3 Monaten	
5. Test nach ca. 6 Monaten	

Dosiserhöhung auf 50 mg - Datum der ersten Einnahme:	
Termine für Leberwertuntersuchungen	Datum
1. Test bei Beginn mit 50 mg Agomelatin	
2. Test nach ca. 3 Wochen	
3. Test nach ca. 6 Wochen	
4. Test nach ca. 3 Monaten	
5. Test nach ca. 6 Monaten	

Ihr Arzt kann entscheiden, dass weitere Blutuntersuchungen erfolgen sollten. Vergessen Sie bitte nicht, diese Broschüre zu Ihren Arztbesuchen mitzunehmen.

Für weitere detaillierte Informationen lesen Sie bitte die Packungsbeilage von Agomelatin.

Agomelatin-ratiopharm 25 mg Filmtabletten (Agomelatin) Patientenheft



Für: _____
Name der Patientin/des Patienten

Von: _____
Kontaktdaten der Ärztin/des Arztes

Liebe Patientin, lieber Patient,

Agomelatin ist ein Antidepressivum, das helfen kann, Ihre Depression zu behandeln. Um Ihre medizinische Behandlung zu optimieren, befolgen Sie bitte die Empfehlungen Ihres Arztes hinsichtlich der Einnahme von Agomelatin (Dosierung, Dauer der Behandlung, mit der Behandlung verbundene Kontrolluntersuchungen entsprechend der festgelegten Termine, Blutuntersuchungen).

Empfehlungen zur Verhinderung von Nebenwirkungen auf die Leber

Agomelatin kann Nebenwirkungen auslösen. Hierzu können auch Veränderungen Ihrer Leberfunktion gehören. Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen Empfehlungen, um Nebenwirkungen auf die Leber zu verhindern sowie Ratschläge, was Sie im Falle des Auftretens dieser Nebenwirkungen während einer Behandlung mit Agomelatin tun sollen.

Bitte fragen Sie Ihren Arzt nach weitergehenden Informationen.

Was sollten Sie vor einer Einnahme von Agomelatin beachten?

Informieren Sie bitte Ihren Arzt, wenn Sie wissen, dass Ihre Leber nicht normal arbeitet.

In diesem Fall sollten Sie Agomelatin nicht einnehmen.

Bitte fragen Sie Ihren Arzt in den folgenden Fällen um Rat:

- Wenn Sie in Ihrer Vorgeschichte jemals Leberprobleme hatten
- Wenn Sie übergewichtig oder fettleibig sind
- Wenn Sie Diabetiker sind
- Wenn Sie Alkohol zu sich nehmen
- Wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen (einige Arzneimittel beeinflussen die Leber)

Was Sie tun können, um Probleme mit der Leber während Ihrer Behandlung zu vermeiden

Lassen Sie die Blutuntersuchungen regelmäßig vornehmen.

Warum?

Ihr Arzt sollte **vor Beginn der Behandlung** untersucht haben, ob Ihre Leber richtig arbeitet. Die von Ihrem Arzt veranlassten Blutuntersuchungen werden ihm Auskunft über die **Funktion Ihrer Leber** geben, um zu entscheiden, ob Agomelatin für Sie persönlich geeignet ist.

Während einer Behandlung mit Agomelatin können bei manchen Patienten erhöhte Leberenzymwerte im Blut auftreten. Die Werte dieser Leberenzyme geben Auskunft über eine normale oder abweichende Leberfunktion und sind für den Arzt in der Beurteilung Ihrer Behandlung ausschlaggebend.

Wann?

	Vor Beginn der Behandlung oder Dosissteigerung	Nach ca. 3 Wochen	Nach ca. 6 Wochen	Nach ca. 3 Monaten	Nach ca. 6 Monaten
Blutuntersuchung	✓	✓	✓	✓	✓

Wenn Ihr Arzt die **Dosierung auf 50 mg erhöht**, müssen die **Untersuchungen nochmals** durchgeführt werden.

Vergessen Sie bitte nicht, Ihre **Erinnerungskarte für die Blutuntersuchungstermine** (siehe umseitig) zu Ihrem Arzt mitzubringen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt umgehend, wenn Sie Informationen über eine Erhöhung Ihrer Leberenzyme während der Behandlung erhalten sollten.

Achten Sie auf Anzeichen von Leberproblemen

Sollten Sie eines der folgenden Symptome beobachten, kann es sein, dass Ihre Leber nicht richtig arbeitet:

- Gelb verfärbte Haut/Augen
- dunkler Urin
- hell gefärbter Stuhlgang
- Schmerzen im rechten Oberbauch
- Ungewöhnliche Erschöpfung (insbesondere in Verbindung mit anderen, oben genannten Symptomen)

Suchen Sie bei diesen Anzeichen unverzüglich Ihren Arzt auf, der Ihnen dann möglicherweise rät, Agomelatin abzusetzen.

Dieses Patientenheft ist kostenlos erhältlich bei: ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm oder unter folgender URL: www.patienteninfo-ratiopharm.de/pzn-14168513.html und auf der BfArM-Webseite www.bfarm.de verfügbar.