

# Sterillium® med

Gebrauchsinformation



Bitte sorgfältig lesen und beachten!

**Sterillium med.** Lösung zur Anwendung auf der Haut.

**Wirkstoff:** Ethanol.

**Hände-Desinfektionsmittel zum Einreiben.**

**Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

**Gegenanzeigen:** Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Hinweis: Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen verursachen.

Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 16 °C, leichtentzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der

Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO<sub>2</sub> löschen. Gebindegrößen ab 1000 ml: Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der**

**Anwendung:** Hygienische Händedesinfektion:

Mindestens 3 ml – 30 Sekunden in die trockenen Hände einreiben und feucht halten.

Chirurgische Händedesinfektion: Mindestens

1,5 Minuten in die trockenen Hände und Unterarme einreiben und feucht halten.

**Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. **Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Das Arzneimittel soll nach dem Ablauf des auf der Vorderseite angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Öffnen des Behältnisses ist die Lösung 1 Jahr haltbar.

Behältnis dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Heizkörpern lagern oder starker Sonnenbestrahlung aussetzen.

**Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten:

Wirkstoff: Ethanol 99% 85,0g;

Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, 1-Propanol (Ph. Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser.

Enthält 89,5 Vol.% Alkohol.

**Darreichungsform:** Lösung zur Anwendung auf der Haut.

**Inhalt:** 50 ml / 100 ml / 500 ml / 1 l / 5 l.

**Pharmazeutischer Unternehmer**

**und Hersteller:** BODE Chemie GmbH,  
Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg.

**Stand der Information:** Juli 2017.

**Arzneimittel – für Kinder unzugänglich aufbewahren.**

**Zul.-Nr.:** 71526.00.00

---

Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Deshalb sollte die Händedesinfektion bei Säuglingen und Kleinkindern nur nach ärztlicher Rücksprache erfolgen.

---

**BODE Chemie GmbH**

Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg,

Tel. +49 40 54006-0, Fax -200,

[www.bode-chemie.com](http://www.bode-chemie.com), [info@bode-chemie.de](mailto:info@bode-chemie.de)