

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SANUKEHL® Klebs D6 Flüssige Verdünnung Homöopathisches Arzneimittel

Wirkstoff: Klebsiella pneumoniae extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D6

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie SANUKEHL® Klebs D6 nicht anwenden?

Nicht anwenden bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Klebsiellen-Arten oder Klebsiella pneumoniae
- Autoimmunerkrankungen
- Kindern unter 12 Jahren
- Schwangeren und Stillenden

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von SANUKEHL® Klebs D6?

Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von SANUKEHL® Klebs D6 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie SANUKEHL® Klebs D6 anwenden?

Zum Einnehmen: Soweit nicht anders verordnet nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten Erkrankungen vor einer Mahlzeit 5 - 10 Tropfen alle 12 bis 24 Stunden ein. Bei chronischen Verlaufsformen werden 10 Tropfen alle 2 Tage eingenommen.

Zum Einreiben: Soweit nicht anders verordnet reiben Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle 1 - 2 Tage 5 - 10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in die Ellenbeuge ein.

Wie lange sollten Sie SANUKEHL® Klebs D6 anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte SANUKEHL® Klebs D6 abgesetzt werden. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.



Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **SANUKEHL® Klebs D6** auftreten?

Aufgrund des Gehaltes von **SANUKEHL® Klebs D6** an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten. Das Auftreten einer Allergie gegen den Bestandteil *Klebsiella pneumoniae* kann nicht ausgeschlossen werden.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweise:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! – Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. – Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. – Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittel-entsorgung.

Zusammensetzung:

10 ml flüssige Verdünnung enthalten: Wirkstoff:

10 ml ***Klebsiella pneumoniae extractum cellulae (lyophil., steril.) Dil. D6*** (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser). 1 Milliliter enthält 22 Tropfen.

Darreichungsform und Inhalt: 10 ml/10 x 10 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen und Einreiben.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-Kehlbeck

GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Tel.: + 49 (0)42 51 - 9352-0

Fax: + 49 (0)42 51 - 93 52 -291

E-Mail: info@sanum.com

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Reg.-Nr.: 33252.00.00

Apothekenpflichtig

Stand der Gebrauchsinformation: 11 / 2017



Trennung an der abstehenden Lasche anfasen und runderum abziehen.



Weiße Schutzkappe mit Daumen und Zeigefinger kräftig anfasen und zur Seite abknicken.



Tropfenweise Entnahme durch vorsichtiges Zusammen-drücken der Gummipipette mit Daumen und Zeigefinger



Nach Gebrauch Schutzkappe fest aufdrücken bis sie hörbar einrastet. Hierdurch dichter Verschluss der Tropfflasche.

