

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe

Salicyl-Vaselin 10 Prozent, Salbe

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 1 Jahr

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe beachten?
3. Wie ist Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe und wofür wird sie angewendet?

Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe ist ein Hornhautmittel.

Die Salbe wird äußerlich angewendet bei:

- vermehrter Hornhautbildung (Hyperkeratosen),
- Hühneraugen (Clavus),
- Schwielen (Kallus)

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung beachten?

Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie allergisch gegen Salicylsäure oder gegen einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei Kontaktüberempfindlichkeit,
- während der Schwangerschaft,
- bei Säuglingen,
- bei eingeschränkter Nierenfunktion,
- zur Behandlung von Hühneraugen, wenn die Fläche der Hühneraugen größer als 5 Quadratzentimeter (cm²) ist,
- im Brustbereich während der Stillzeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe anwenden.

Keine Anwendung bei eingeschränkter Nierenfunktion. Keine Anwendung bei Säuglingen. Besondere Vorsicht bei der Anwendung dieses Arzneimittels ist erforderlich, wenn die unter Abschnitt 4 beschriebenen Beschwerden verstärkt auftreten. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Arzt oder Apotheker.

Kinder und Jugendliche

Wenden Sie Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälalbe nicht bei Säuglingen an. Eingeschränkte Anwendung bei Kindern; siehe Dosierungsschema im Abschnitt 3.

Anwendung von Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälalbe zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer, an gleicher Stelle aufgetragener Arzneimittel verstärken. Vom Körper aufgenommene Salicylsäure verzögert den Abbau von Methotrexat und verstärkt die Wirkung von Sulfonylharnstoffen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien durchgeführt. Beeinträchtigungen sind nicht bekannt.

3. Wie ist Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälalbe anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Tragen Sie Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälalbe ein- bis zweimal täglich auf die Haut auf.

Alter	Maximale Tagesdosis Salbe	Maximale Tagesdosis Wirkstoff
Kinder ab 1 Jahr	höchstens 2 g	weniger als 0,2 g
Erwachsene	weniger als 20 g	weniger als 2,0 g

Nicht länger als eine Woche anwenden.

Wenn Sie eine größere Menge von Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälalbe angewendet haben als Sie sollten

und sich aufgrund der höheren Dosis Beschwerden einstellen, benachrichtigen Sie Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Anwendung von Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälalbe vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälalbe abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Auf den Stellen, an denen Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe aufgetragen wurde, kann es zu Hautreizungen kommen.

In sehr seltenen Fällen kann es zu einer vorher nicht bekannten Überempfindlichkeitsreaktion (Kontaktsensibilisierung) gegenüber Salicylsäure kommen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder im Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe enthält

- Der Wirkstoff ist Salicylsäure.
100 g Salbe enthalten 10 g Salicylsäure.
- Die sonstigen Bestandteile sind: dünnflüssiges Paraffin, weißes Vaseline.

Wie Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe aussieht und Inhalt der Packung

Allgäuer Latschenkiefer® Hornhaut Schälsalbe ist in einer Tube mit 50 g Salbe erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Allgäuer Latschenkiefer GmbH
Mittagstraße 19-21
87527 Sonthofen
www.latschenkiefer.de

Hersteller

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2017.