

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

### Nemacynar® NESTMANN

Wirkstoff: Artischockenblätter-Dickextrakt

Pflanzliches Arzneimittel bei  
Verdauungsbeschwerden

#### Anwendungsgebiete:

Bei Verdauungsstörungen (dyspeptischen Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder regelmäßig wiederkehren, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden.

#### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie Nemacynar® nicht einnehmen?*

Bei bekannter Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Artischocken und andere Korbblütler oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sowie bei Verschluss der Gallenwege darf Nemacynar® nicht angewendet werden.

*Wann dürfen Sie Nemacynar® erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?*

Bei Gallensteinleiden soll Nemacynar® nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Das Arzneimittel soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Zur Anwendung von Nemacynar® bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Dieses Arzneimittel enthält 29,7 Vol.-% Alkohol.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Bei gleichzeitiger Gabe von Nemacynar® kann die Wirksamkeit von blutgerinnungshemmenden Mitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin) abgeschwächt sein. Deshalb kann es notwendig sein, dass die Dosierung dieser Arzneimittel angepasst werden muss. Patienten, die Nemacynar® und gleichzeitig Arzneimittel mit einem dieser Wirkstoffe einnehmen, sollten daher ihren Arzt aufsuchen.

#### Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahren 3mal täglich jeweils vor den Mahlzeiten 40 Tropfen in etwas Flüssigkeit ein.

#### Überdosierung und andere Anwendungsfehler:

Vergiftungen mit Zubereitungen aus Artischockenblättern sind bisher nicht bekannt geworden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie zuwenig von Nemacynar® genommen haben oder die Einnahme von Nemacynar® vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

#### Nebenwirkungen:

Sehr selten werden über leichte Durchfälle mit typischer Begleitsymptomatik (z.B. Bauchkrämpfe) sowie über Oberbauchbeschwerden, Übelkeit und Sodbrennen berichtet.

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Hautausschläge auftreten.

Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, so informieren Sie Ihren Arzt, damit er über Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Nemacynar® nicht nochmals eingenommen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

#### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums soll das Präparat nicht mehr angewendet werden.

Nicht über 25 °C lagern.

Das Arzneimittel ist nach Anbruch des Behältnisses 2 Monate haltbar.

#### Zusammensetzung:

100 g (=94,8 ml) Flüssigkeit enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:  
33,3 g Dickextrakt aus Artischockenblättern  
(2,5 - 3,5 : 1)

Auszugsmittel: Ethanol 20 % (V/V).

Sonstige Bestandteile: Wasser, Ethanol.

Dieses Präparat enthält 29,7 Vol.-% Alkohol.

Flüssigkeit

Originalpackungen zu 50 ml und 100 ml.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

NESTMANN Pharma GmbH  
Weiberweg 17  
D-96199 Zapfendorf/Bamberg  
Tel. 09547/92210 • Fax 09547/215

#### Stand der Information:

November 2014

Auf Grund des in diesem Arzneimittel enthaltenen pflanzlichen Extraktes können Trübungen oder Ausfällungen auftreten, die allerdings keinen Einfluss auf die Wirksamkeit haben.