

Nr. 11 Silicea D12 Tabletten

Biochemie nach Dr. Schüßler

Homöopathisches Arzneimittel

Gebrauchsinformation

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Darreichungsform:

Tabletten zum Einnehmen

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung dieses Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Nr. 11 Silicea D12 Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Nr. 11 Silicea D12 Tabletten beachten?
3. Wie ist Nr. 11 Silicea D12 Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Nr. 11 Silicea D12 Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Nr. 11 Silicea D12 Tabletten und wofür wird es angewendet?

Nr. 11 Silicea D12 Tabletten ist ein homöopathisches Arzneimittel.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Nr. 11 Silicea D12 Tabletten beachten?

Dieses Arzneimittel enthält Lactose.

Bei bekannter Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern ist Nr. 11 Silicea D12 Tabletten nur nach ärztlicher Rücksprache einzunehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen bei Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte eine Anwendung nur nach ärztlicher Rücksprache erfolgen.

Bei Einnahme von Nr. 11 Silicea D12 Tabletten mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bei der gleichzeitigen Einnahme mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt.

3. Wie ist Nr. 11 Silicea D12 Tabletten einzunehmen?

Nehmen Sie Nr. 11 Silicea D12 Tabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenosis. Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte, Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenosis.

Zur Festlegung einer individuellen Dosierung halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Therapeuten.

Dauer der Anwendung:

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass durch eine Überdosierung keine unerwünschten

A large, bold white number '11' centered on a dark blue square background.

ten Wirkungen auftreten. Es wird empfohlen, in diesem Fall einen Arzt, Therapeuten oder Apotheker zu befragen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis:

Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Nr. 11 Silicea D12 Tabletten aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Packungen nach Entnahme jeweils wieder gut verschließen.

Das Arzneimittel sollte, besonders nach Anbruch, an einem kühlen, trockenen Ort (z.B. im Schlafzimmer) aufbewahrt werden.

Hinweis zur Haltbarkeit:

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden. Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

6. Weitere Informationen

Was Nr. 11 Silicea D12 Tabletten enthält:

Als arzneilicher Wirkstoff ist in einer Tablette enthalten: Silicea Trit. D12 250 mg

Sonstige Bestandteile sind: Kartoffelstärke, Calciumbenzat (DAB)

Nr. 11 Silicea D12 Tabletten ist glutenfrei.

Wie Nr. 11 Silicea D12 Tabletten in den Handel kommt:

Nr. 11 Silicea D12 Tabletten ist in Packungen zu 100, 400 und 800 Tabletten in Apotheken erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

orthim GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 17 - 19
33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: +49 (0) 52 45 / 92 010 - 0
E-Mail: info@orthim.de
www.orthim.de

Reg.-Nr.: 8555.55.53

Stand der Information: 11/2019

