



## Gebrauchsinformation

**Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile beachten?
3. Wie ist Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

# Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile



## Flüssige Verdünnung zur Injektion

### 1. Was ist Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile und wofür wird es angewendet?

Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

### Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten die Anregung und die Harmonisierung des Rhythmischen Systems durch Integrierung der Formprozesse des Aufbaustoffwechsels, z.B. Missempfindungen im Herzbereich (Dyskardien), bestimmte Herzrhythmusstörungen (funktionelle Extrasystolie), latente Herzmuskelschwäche; psychische Labilität, psychotische Syndrome.

### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile beachten?

**Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile darf nicht angewendet werden,** wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Milchprotein sind.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die Einnahme anderer vom Arzt verordneter Arzneimittel. Bei Atemnot oder Ansammlung von Wasser in den Beinen sowie bei allen anhaltenden oder unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden. Insbesondere bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, sowie bei anhaltenden depressiven Verstimmungen oder starker Unruhe im und nach dem Wochenbett sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden.

### Kinder

Bei Kindern unter 18 Jahren soll Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt um Rat.

### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **3. Wie ist Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile anzuwenden?**

Wenden Sie Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis für Erwachsene:*

2 – 3 mal wöchentlich bis 1 – 3 mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

Die subcutane Injektion erfolgt in der Regel in den Oberschenkel oder die Oberarm-außenseite bzw. in die Bauchregion. Nach Säuberung der Einstichstelle (z.B. durch Abreiben mit 70%igem Alkohol) eine Hautfalte bilden und die Injektionsnadel schräg einstechen. Den Spritzenstempel leicht zurückziehen. Sollte Blut erscheinen, wurde ein Blutgefäß getroffen. Die Injektion in diesem Fall an einer anderen Stelle wiederholen. Wenn kein Blut erscheint, langsam injizieren, anschließend die Nadel herausziehen und auf die Einstichstelle kurz mit einem Tupfer drücken.

Es wird in jedem Fall empfohlen, die Injektionstechnik durch eine darin erfahrene Person zu erlernen.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

*Wenn Sie die Anwendung von Aurum D10 3 Teile / Stibium D8 2 Teile vergessen haben:*

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Lactose enthält geringe Mengen Milchprotein und kann deshalb allergische Reaktionen hervorrufen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf den Ampullen und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 25 °C lagern.

#### **Zusammensetzung**

1 Ampulle enthält: Wirkstoffe: Aurum metallicum praeparatum Dil. D10 aquos. 0,6 g / Stibium metallicum praeparatum Dil. D8 aquos. 0,4 g.

Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

#### **Darreichungsform und Packungsgröße**

8 Ampullen zu 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** Dezember 2014

