

# Gebrauchsinformation

Homöopathisches Arzneimittel

## VETOKEHL® BOV D6

Flüssige Verdünnung

Für Tiere

Pferd, Rind, Hund, Katze, Hühner, Puten, Tauben, Enten, Gänse,  
Wachteln, kleine Nagetiere, Ziervögel



**Wirkstoff:** Mycobacterium bovis (BCG) e volumine cellulae (lyophil., steril.) D6 Dil.

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

**Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

**Wechselwirkungen:** Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn VETOKEHL® Bov D6 gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

**Zieltierarten:** Pferd, Rind, Hund, Katze, Hühner, Puten, Tauben, Enten, Gänse, Wachteln, kleine Nagetiere, Ziervögel

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet:

Zum Einreiben: 5 - 10 Tropfen am Ort der Erkrankung

Zum Eingeben:

bei Pferden und Rindern: 1x täglich 20 Tropfen

bei Fohlen, Kälbern: 1x täglich 10 Tropfen

bei Hunden, Katzen, kleinen Nagetieren, Ziervögeln: 1x täglich 5 Tropfen

bei Geflügel: 5 ml täglich in das Trinkwasser für 500 Tiere

Die Dosierung soll dem Befund angepasst werden.

Die Anwendung des Präparates sollte beendet werden, wenn die für das Arzneimittelbild relevanten Symptome nicht mehr auftreten.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die richtige Anwendung:** Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.





**Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation oder der Legeperiode:** Zur Verträglichkeit von **VETOKEHL® Bov D6** bei trächtigen und laktierenden Tieren sowie bei Tieren in der Legeperiode liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation bzw. während der Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

**Hinweis:** Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

**Wartezeit:**

Rind, Pferd, Geflügel	0 Tage
Essbares Gewebe:	0 Tage
Milch:	0 Tage
Eier:	0 Tage

**Besondere Lagerhinweise:**

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!  
Bitte lagern Sie das Arzneimittel nicht über 25 °C!

Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. – Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. – Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

**Zusammensetzung:**

5 ml enthalten: Wirkstoff:  
5 ml Mycobacterium bovis (BCG) e volumine cellulae (lyophil., steril.) D6 Dil. (HAB, Vorschrift 5a).

**Darreichungsform und Inhalt:**

5 ml / 10 x 5 ml flüssiger Verdünnung zum Eingeben und Einreiben.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG**

Hasseler Steinweg 9 · D-27318 Hoya



Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 31925.00.00

**Stand der Gebrauchsinformation:** 03 / 2020



Trennung an der abstehenden Lasche anlassen und runderum abziehen.



Weißer Schutzkappe mit Daumen und Zeigefinger kräftig anlassen und zur Seite abknicken.



Tropfenweise Entnahme durch vorsichtiges Zusammendrücken der Gummipipette mit Daumen und Zeigefinger.



Nach Gebrauch Schutzkappe fest aufdrücken bis sie hörbar einrastet. Hierdurch dichter Verschluss der Tropfflasche.

**Hinweis:** Zur weiteren Anwendung steht Ihnen **VETOKEHL® Bov Flüssige Verdünnung** zur Injektion zur Verfügung.

