

Empfängnisverhütung

Wenden Sie zurzeit Verhütungsmittel an?

Ja Nein

Falls ja, notieren Sie bitte hier die Bezeichnungen:

Nehmen Sie diese Karte zu Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen mit; sie/er wird Sie informieren, ob Sie zusätzliche oder andere Verhütungsmethoden benötigen.

Stand dieser Information: September 2017

Version 01.0

Wichtige Warnhinweise zur Anwendungssicherheit für Patienten, die Bosentan Heumann einnehmen

Diese Karte enthält wichtige Informationen zu Bosentan Heumann. Bitte lesen Sie diese Karte sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme von Bosentan Heumann beginnen.

Ihr Name: _____

Behandelnder Arzt: _____

Wenn Sie Fragen zu Bosentan Heumann haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.



HEUMANN

Seite 4 (Rückseite)

Seite 1 (Titel)

Wenn Sie eine Frau im gebärfähigen Alter sind, lesen Sie diese Karte bitte sehr sorgfältig

Schwangerschaft

Bosentan Heumann kann schädliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Feten haben. Daher dürfen Sie Bosentan Heumann nicht einnehmen, wenn Sie schwanger sind. Sie dürfen während der Behandlung mit Bosentan Heumann auch nicht schwanger werden.

Darüber hinaus kann es, wenn Sie an pulmonaler Hypertonie leiden, bei einer Schwangerschaft zu einer schwerwiegenden Verschlechterung Ihrer Krankheitssymptome kommen. Falls Sie vermuten, dass Sie schwanger sind, informieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt oder Gynäkologen.

Empfängnisverhütung

Eine Verhütung basierend auf Hormonen – wie orale Verhütungsmittel oder Antibabypillen, Hormonspritzen, Implantate oder Verhütungspflaster, ist keine zuverlässige Methode, um eine Schwangerschaft bei mit Bosentan Heumann behandelten Frauen zu verhindern. Sie müssen Barriere-Methoden – wie ein Kondom für die Frau, Diaphragma oder einen Verhütungsschwamm – zusätzlich zu irgendeinem dieser hormonalen Verhütungsmittel anwenden. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie alle Ihre Fragen mit Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen besprechen – füllen Sie bitte die Rückseite dieser Karte aus und bringen Sie diese Karte zu Ihrem nächsten Besuch bei Ihrem behandelnden Arzt oder Gynäkologen mit.

Bei Ihnen sollte ein Schwangerschaftstest vor Beginn der Bosentan-Therapie und monatlich während der Behandlung durchgeführt werden, auch wenn Sie glauben, dass Sie nicht schwanger sind.

Datum des ersten monatlichen Schwangerschaftstests: _____

Blutuntersuchung zur Leberfunktion

Bei einigen Patienten, die Bosentan eingenommen haben, wurden veränderte Leberfunktionswerte festgestellt. Während der Behandlung mit Bosentan Heumann wird Ihr Arzt Termine für regelmäßige Blutuntersuchungen ansetzen. Dabei wird überprüft, ob Veränderungen Ihrer Leberfunktion aufgetreten sind.

Denken Sie an die monatliche Blutuntersuchung zur Leberfunktion.

Nach einer Dosiserhöhung wird ein zusätzlicher Test nach 2 Wochen durchgeführt.

Datum des ersten monatlichen Tests: _____

Termine für Ihre monatliche Blutuntersuchung zur Leberfunktion:

Jan _____ Apr _____ Juli _____ Okt _____

Feb _____ Mai _____ Aug _____ Nov _____

März _____ Juni _____ Sept _____ Dez _____

Seite 2 (Innen links)

Seite 3 (Innen rechts)