



# Anti-Hornhaut FORTE

## Salbe

Wirkstoff: Salicylsäure 10 Prozent (Salicyl-Vaseline)  
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Anti-Hornhaut FORTE und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Anti-Hornhaut FORTE beachten?
3. Wie ist Anti-Hornhaut FORTE anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Anti-Hornhaut FORTE aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Anti-Hornhaut FORTE und wofür wird es angewendet?

Anti-Hornhaut FORTE ist ein Hornhautmittel.

#### Anwendungsgebiete:

- Die Salbe wird äußerlich angewendet bei:
- Vermehrter Hornhautbildung (Hyperkeratosen),
  - Schwielen (Kallus).

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Anti-Hornhaut FORTE beachten?

Anti-Hornhaut FORTE darf nicht angewendet werden:

- Wenn Sie allergisch gegen Salicylsäure oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- bei Kontaktüberempfindlichkeit,
- während der Schwangerschaft,
- bei Säuglingen,
- bei eingeschränkter Nierenfunktion,
- im Brustbereich während der Stillzeit.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Anti-Hornhaut FORTE anwenden.

Wenden Sie dieses Arzneimittel nicht bei eingeschränkter Nierenfunktion oder bei Säuglingen an. Besondere Vorsicht bei der Anwendung dieses Arzneimittels ist erforderlich, wenn die unter Abschnitt 4 beschriebenen Beschwerden verstärkt auftreten. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Anwendung von Anti-Hornhaut FORTE zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer, an gleicher Stelle aufgetragener Arzneimittel verstärken. Vom Körper aufgenommene Salicylsäure verzögert den Abbau von Methotrexat und verstärkt die Wirkung von Sulfonylharnstoffen.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

Es wurden keine Studien durchgeführt. Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

#### Schwangerschaft und Stillzeit:

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Während der Schwangerschaft sollte dieses Arzneimittel nicht angewendet werden.

Wenden Sie dieses Arzneimittel während der Stillzeit nicht im Brustbereich an.

#### Kinder:

Anti-Hornhaut FORTE darf nicht bei Säuglingen angewendet werden. Zur Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren siehe Abschnitt 3.





### 3. Wie ist Anti-Hornhaut FORTE anzuwenden?

Wenden Sie Anti-Hornhaut FORTE immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt: Tragen Sie Anti-Hornhaut FORTE 1- bis 2-mal täglich auf die betroffenen Hautpartien auf.

Erwachsene: Die maximale Tagesdosis beträgt 20 g Salbe (weniger als 2 g Wirkstoff).

Kinder ab 6 Jahren: Die maximale Tagesdosis beträgt 2 g Salbe (weniger als 0,2 g Wirkstoff).

Wenden Sie dieses Arzneimittel nicht länger als 1 Woche an.

### Wenn Sie eine größere Menge Anti-Hornhaut FORTE angewendet haben, als Sie sollten

und sich aufgrund der höheren Dosis Beschwerden einstellen, benachrichtigen Sie Ihren Arzt. Dieser kann ggf. über erforderliche Maßnahmen entscheiden.

### Wenn Sie die Anwendung von Anti-Hornhaut FORTE vergessen haben:

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

### Wenn Sie die Anwendung von Anti-Hornhaut FORTE abbrechen:

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Auf den Stellen, an denen Anti-Hornhaut FORTE aufgetragen wurde, kann es zu Hautreizungen kommen. In sehr seltenen Fällen (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten betreffen) kann es zu einer vorher nicht bekannten Überempfindlichkeitsreaktion (Kontakt-sensibilisierung) gegenüber Salicylsäure kommen.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Abt. Pharmakovigilanz Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Wie ist Anti-Hornhaut FORTE aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. der Tube nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

In der Originalpackung zwischen 5 °C und 25 °C aufbewahren.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung).

### 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### Was Anti-Hornhaut FORTE enthält:

Der Wirkstoff ist: Salicylsäure

100 g Salbe enthalten 10 g Salicylsäure

Die sonstigen Bestandteile sind: dünnflüssiges Paraffin, weißes Vaseline

#### Wie Anti-Hornhaut FORTE aussieht und Inhalt der Packung:

Anti-Hornhaut FORTE ist eine weiße, fast geruchlose Salbe. Sie ist in Aluminiumtuben mit 50 g Inhalt erhältlich.

#### Hersteller und Pharmazeutischer Unternehmer:

DISTRICON GmbH  
Standort Bielefeld  
Heidsieker Heide 114  
D-33739 Bielefeld

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2019.**

