

Gebrauchsinformation**Skinman® soft**

60 % 2-Propanol, 0,15 % Benzalkoniumchlorid, 0,1 % Undecylensäure
Lösung zur Anwendung auf der Haut

Indikationsgruppe:

Händedesinfektionsmittel

Anwendungsgebiete:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Gegenanzeigen:

Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe.

Bei sachgemäßem Gebrauch kann Skinman® soft während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Entzündlich! Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (n. DIN 51755): 22 °C. Kontakt mit den Augen unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt des Arzneimittels mit den Augen sofort mit viel Wasser (auch unter den Augenlidern) mindestens 15 Minuten spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Bisher keine bekannt.

Dosieranleitung und Art der Anwendung:

Gebrauchsfertige Lösung; Produkt unverdünnt anwenden.

- Hygienische Händedesinfektion:
3 ml 30 Sek. in den Händen verreiben.
- Chirurgische Händedesinfektion:
2 x 5 ml je 1 1/2 Min. in den Händen verreiben. Die Hände müssen während der gesamten Anwendungsdauer feucht gehalten werden.
- Bei Kontamination mit TB:
2 x 3 ml je 1/2 Min. in den Händen verreiben.
- Bei Kontamination mit Rotaviren:
1 Min., Hände ausreichend benetzen.

Bei Fragen zur Klärung der Anwendung bitte den Arzt oder Apotheker befragen.

Nebenwirkungen:

Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Kontaktreaktionen sind möglich.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Aufbewahrung des Arzneimittels:

In Originalgebinden nicht über + 25 °C lagern.

Arzneimittel nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Nach Anbruch 18 Monate haltbar. Arzneimittel sachgerecht entsorgen.

Nur bei Gebindegrößen ab 1000 ml:

Ein Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Nur bei Gebindegrößen bis 1000 ml:

Verfalldatum s. Vorderseite.

Zusammensetzung:

100 g Skinman® soft enthalten:

Wirkstoffe:

60 g 2-Propanol, 0,15 g Benzalkoniumchlorid, 0,1 g Undecylensäure.

Sonstige Bestandteile:

Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Geruchsstoffe, Patentblau V (E 131), gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt:

Lösung zur Anwendung auf der Haut zu 100 ml, 500 ml, 1 L bzw. 5 L.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein

Stand der Information: 10/2017