



## NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS/HERSTELLERS

WH Pharmawerk Weinböhla GmbH  
Poststraße 58  
01689 Weinböhla  
Bundesrepublik Deutschland

## HUMOCARB FORMULIERT®

Humocarb formuliert, Pulver  
Huminsäuren (Humocarb) 994 mg/g  
zum Eingeben über das Futter für Rinder,  
Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde,  
Katzen und Ziervögel

## WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

100 g Humocarb formuliert, Pulver enthalten:

### Wirkstoffe:

Huminsäuren (Humocarb) 99,4 g

Humocarb formuliert ist ein schwarzbraunes Pulver.

## ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Therapie und Metaphylaxe von Magen- und Darmerkrankungen:

- Unspezifische Durchfälle (z. B. ernährungsbedingt) oder infektiöse (durch Bakterien oder Viren verursachte) Durchfälle
- Verdauungsstörungen aufgrund von Fäulnis- und Gärungsprozessen (Dyspepsie) sowie Stoffwechselfdysregulationen, die durch Umstellung, Futterwechsel, Fehlfütterung oder verminderte Futteraufnahme bedingt sind
- Normalisierung der obligaten bakteriellen Magen-Darm-Flora und der davon abhängigen Regenerierung des Stoffwechsels
- Entfernung bestimmter, mit dem Futter aufgenommener schädlicher Verbindungen (z. B. Pilzgifte, Pestizid- und Schwermetallbelastungen) sowie erst im Magen-Darm-Bereich gebildeter Schadstoffe oder deren Umwandlungsprodukte

## GEGENANZEIGEN

Keine bekannt.

## NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## ZIELTIERARTEN

Rinder, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen, Ziervögel

## DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

### Therapie:

Rind, Kalb, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd:

0,3 – 0,5 g Humocarb formuliert  
pro kg Körpergewicht (KGW) pro Tag  
Behandlungsdauer: 7 – 15 Tage

Hund, Katze:

0,5 – 1 g Humocarb formuliert  
pro kg Körpergewicht (KGW) pro Tag  
Behandlungsdauer: 5 – 10 Tage

Ziervögel:

1 g Humocarb formuliert in 10 ml Wasser einmischen und tropfenweise mehrmals täglich eingeben.

Behandlungsdauer: 5 Tage

Zur Prophylaxe bei anfälligen Tieren insbesondere Jungtieren bei Futterumstellung bzw. Umstallung ist die halbe therapeutische Dosis über 10 bis 20 Tage ausreichend.

Es ist darauf zu achten, dass die vorgesehene Dosis jeweils restlos aufgenommen wird. Dazu ist das Pulver vor jeder Applikation in einen Teil des Futters frisch einzumischen und vor der eigentlichen Fütterung zu verabreichen.

Bei Tieren mit schweren Durchfallerkrankungen sollte der Tierarzt zusätzliche therapeutische Maßnahmen ergreifen.



## **HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Keine Angaben

### **WARTEZEIT**

Rind, Pferd,

Schaf, Ziege: essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

Schwein: essbare Gewebe: 0 Tage

### **BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

### **BESONDERE WARNHINWEISE**

Die Verabreichung beim Kalb sollte grundsätzlich erst ab dem 2. bis 3. Lebenstag beginnen.

Bei Verabreichung in Verbindung mit oral wirksamen Chemotherapeutika kann innerhalb von 2 h eine resorptionsmindernde Wirkung eintreten.

## **BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann.

Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

### **GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

Mai 2015

### **WEITERE ANGABEN**

#### **Apothekenpflichtig**

#### **Packungsgrößen:**

150 g, 1 kg, 3 kg

01/18

---

#### **Hinweis zur Dosierung:**

1 gestr. Teelöffel ca. 2 g, 1 gehäufte Teelöffel ca. 5 g, 1 gestr. Eßlöffel ca. 5 g, 1 gehäufte Eßlöffel ca. 15 g