

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Diabetan®

Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweis für den Anwender: Bei während der Anwendung dieses Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Gegenanzeigen:

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Siehe unter Punkt „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Diabetan® darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht verabreicht werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 16 Vol.-% Alkohol.

Art der Anwendung, Dauer der Anwendung:

1 ml Diabetan® entspricht 20 Tropfen.

Zur korrekten Dosisentnahme ist die Tropfflasche schräg (45°-Winkel) zu halten (nicht senkrecht).

bitte wenden!

Wie lang sollten Sie Diabetan® anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweis für den Fall der Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn Diabetan® in zu großen Mengen angewendet wurde (Überdosierung)?

Bei der Einnahme größerer Mengen dieses Arzneimittels werden bis zu 15 g Alkohol (bei der Einnahme des gesamten 100-ml-Flascheninhalts) aufgenommen; dies kann, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Fragen zur Klärung der Anwendung ist der Arzt oder Apotheker zu befragen.

Nebenwirkungen:

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Diabetan® soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. Das Verfalldatum befindet sich auf der Schachtel und auf dem Flaschenetikett.

Zusammensetzung:

1 ml Mischung enthält: Wirkstoffe: 0,01 ml Acidum arsenicosum Dil.D4, 0,01 ml Acidum phosphoricum Dil.D3, 0,01 ml Vaccinium myrtillus Dil.D2, 0,01 ml Phaseolus nanus (HAB 34) Dil.D2 (HAB, V. 3a), 0,01 ml Syzygium cumini Ø. Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), gereinigtes Wasser. Enthält 16 Vol.-% Alkohol.

Darreichungsform und Inhalt:

100 ml (N2), Mischung zum Einnehmen.

Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:

SCHUCK GmbH, Industriestr. 11, 90571 Schwaig,
Tel. 0911/500185, Fax 0911/508802, E-Mail: info@schuck-arzneimittel.de

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nicht über 25° C lagern!

Datum und Fassung der Packungsbeilage: März 2019