



Patientenpass

Tolvaptan-ratiopharm®

Wichtige Sicherheitsinformationen für Patienten
Bitte tragen Sie diese Karte immer bei sich.

Wichtige Sicherheitsinformation für Nothelfer

Tolvaptan-ratiopharm® kann eine Leberschädigung verursachen.

Leberfunktionstests sollten in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden (in den ersten 18 Monaten monatlich und danach alle 3 Monate während der Therapie).

Tolvaptan-ratiopharm® hemmt den Mechanismus von Vasopressin in den Nieren und kann daher das Urinvolumen erhöhen und starken Wasserverlust oder Dehydratation verursachen.

Symptome einer Dehydratation können sein: vermehrter Durst, trockener Mund, Müdigkeit, Schläfrigkeit, verringerter Urinabsatz, Kopfschmerzen, trockene Haut, Schwindel, Herzpochen, Verwirrung und verminderte Hautelastizität.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Name des Patienten:

Datum der Erstverschreibung von Tolvaptan-ratiopharm®:

Name des Arztes:

Name des Behandlungszentrums:

Kontakttelefonnummer des Behandlungszentrums:

Wichtige Sicherheitsinformationen für Patienten

Tolvaptan-ratiopharm® kann sich auf die Funktion Ihrer Leber auswirken

Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie Symptome wie Müdigkeit, Appetitverlust, Oberbauchbeschwerden, Fieber, dunklen Urin oder Gelbfärbung der Haut, Gelenk- und Muskelschmerzen mit Fieber (grippeähnliche Symptome), Juckreiz, Übelkeit und Erbrechen bemerken.

Tolvaptan-ratiopharm® kann einen schweren Wasserverlust verursachen.

Trinken Sie reichlich Flüssigkeit, um einen übermäßigen Wasserverlust zu vermeiden und suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie nicht in der Lage sein sollten, ausreichend Flüssigkeit zu trinken.