

WICHTIG – PATIENTENPASS

Abacavir/Lamivudin beta 600 mg/300 mg Filmtabletten

Tragen Sie diese Karte immer bei sich.

Da Abacavir/Lamivudin beta den Wirkstoff Abacavir enthält, können einige Patienten, die Abacavir/Lamivudin beta einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese **kann lebensbedrohlich werden**, wenn Abacavir/Lamivudin beta weiterhin eingenommen wird. **SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG**, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit Abacavir/Lamivudin beta absetzen müssen, wenn

1. Sie einen Hautausschlag bekommen ODER
2. Sie aus mindestens ZWEI der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln:
 - Fieber
 - Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
 - Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
 - starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

(Rückseite beachten)

Wenn Sie Abacavir/Lamivudin beta aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER** Abacavir/Lamivudin beta oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel ein, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Abacavir/Lamivudin beta entwickelt, setzen Sie sich bitte **SOFORT** mit Ihrem Arzt in Verbindung.

Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift mit Telefonnummer Ihres behandelnden Arztes:

Arzt _____ Telefon _____

Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z.B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).

Für allgemeine Anfragen zu Abacavir/Lamivudin beta wenden Sie sich bitte an:
betapharm Arzneimittel GmbH, Kobelweg 95, 86156 Augsburg, Telefon 0821 748810