

# Gebruuchsinformation

*Liebe Patientin, lieber Patient!*

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## NIGERSAN® D5 Flüssige Verdünnung Homöopathisches Arzneimittel

**Wirkstoff:** *Aspergillus niger* e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Hinweis an den Anwender:** Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie NIGERSAN® D5 nicht anwenden?*

Nicht anwenden bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (*Aspergillus niger*)
- Autoimmunerkrankungen
- Kindern unter 12 Jahren
- Schwangerschaft und Stillzeit

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Keine bekannt.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von **NIGERSAN® D5** beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

**Allgemeiner Hinweis:** Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie NIGERSAN® D5 anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet:

**Zum Einnehmen:** 1 - 2x täglich 5 Tropfen vor einer Mahlzeit

**Zum Einreiben:** Einmal täglich 5 - 10 Tropfen in die Ellenbeuge einreiben

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahmen zu reduzieren.

1 Milliliter **NIGERSAN® D5** enthält 22 Tropfen.

Hinweise zur korrekten Entnahme aus der Tropfflasche: siehe unten

*Wie lange sollten Sie NIGERSAN® D5 anwenden?*

Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte **NIGERSAN® D5** abgesetzt werden. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet / eingenommen werden.



**Nebenwirkungen:** Aufgrund des Gehaltes von **NIGERSAN® D5** an spezifischen organischen Bestandteilen können Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil *Aspergillus niger* ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

**Hinweis:** Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! – Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. – Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. – Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

**Zusammensetzung:**

10 ml flüssige Verdünnung enthalten:

Wirkstoff:

10 ml *Aspergillus niger* e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5 (HAB, V. 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser).

**Darreichungsform und Inhalt:**

10 ml / 10 x 10 ml flüssige Verdünnung zum Einnehmen und Einreiben in die Haut.



**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**SANUM-Kehlbeck**  
GmbH & Co. KG

Postfach 1355 · D-27316 Hoya  
Tel.: + 49 (0)42 51 - 9352-0  
Fax: + 49 (0)42 51 - 9352 -291  
E-Mail: [info@sanum.com](mailto:info@sanum.com)

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Reg.-Nr.: 205.00.00

Apothekenpflichtig

**Stand der Gebrauchsinformation: 11 / 2017**



Trennung an der abstehenden Lasche anfasen und rundherum abziehen.



Weiße Schutzkappe mit Daumen und Zeigefinger kräftig anfasen und zur Seite abknicken.



Tropfenweise Entnahme durch vorsichtiges Zusammen-drücken der Gummipipette mit Daumen und Zeigefinger.



Nach Gebrauch Schutzkappe fest aufdrücken, bis sie hörbar einrastet. Hierdurch dichter Verschluss der Tropfflasche.

**Hinweis:** Zur weiteren Anwendung stehen **NIGERSAN®** Flüssige Verdünnung zur Injektion, Kapseln, Tabletten und Zäpfchen zur Verfügung.

