



## Gebrauchsinformation

**Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Bryophyllum 5 % und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Bryophyllum 5 % beachten?
3. Wie ist Bryophyllum 5 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

# Bryophyllum 5 % (1 ml)

## Injektionslösung



WELEDA

Wirkstoff: wässriger Auszug aus Kalanchoe pinnata, Folium rec.

### 1. Was ist Bryophyllum 5 % und wofür wird es angewendet?

Bryophyllum 5 % ist ein anthroposophisches Arzneimittel.

#### Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Anfälligkeit für besondere Formen von funktionellen Störungen und wiederholt auftretenden Entzündungen im Bereich des Stoffwechselsystems; Schmerzzustände bei Schwächung der Lebenskräfte; Unruhe- und seelische Ausnahmezustände und dadurch bedingte Schlafstörungen.

### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Bryophyllum 5 % beachten?

#### Bryophyllum 5 % darf nicht angewendet werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Bryophyllum (Kalanchoe) sind.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

#### Kinder

Bei Kindern unter 12 Jahren soll Bryophyllum 5 % Injektionslösung nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Wie alle Arzneimittel sollte Bryophyllum 5 % in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### 3. Wie ist Bryophyllum 5 % anzuwenden?

Wenden Sie Bryophyllum 5 % immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes an.

*Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:*  
2 mal wöchentlich bis 1 mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

Die subcutane Injektion erfolgt in der Regel in den Oberschenkel oder die Oberarm-  
außenseite bzw. in die Bauchregion. Nach Säuberung der Einstichstelle (z.B. durch  
Abreiben mit 70%igem Alkohol) eine Hautfalte bilden und die Injektionsnadel schräg  
einstechen. Den Spritzenstempel leicht zurückziehen. Sollte Blut erscheinen, wurde ein  
Blutgefäß getroffen. Die Injektion in diesem Fall an einer anderen Stelle wiederholen.  
Wenn kein Blut erscheint, langsam injizieren, anschließend die Nadel herausziehen und  
auf die Einstichstelle kurz mit einem Tupfer drücken.

Es wird in jedem Fall empfohlen, die Injektionstechnik durch eine darin erfahrene Person  
zu erlernen.

#### *Dauer der Anwendung*

Die Behandlung der Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt inner-  
halb dieses Zeitraumes keine Besserung ein, sollte ein Arzt konsultiert werden. Die Dauer  
der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

#### *Wenn Sie die Anwendung von Bryophyllum 5 % vergessen haben:*

Verwenden Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen  
haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung  
dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Bryophyllum 5 % Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei  
jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.  
Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben  
sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und  
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn,  
Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de)* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie  
dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur  
Verfügung gestellt werden.

#### **5. Was ist sonst noch wichtig?**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf den Ampullen und der Faltschachtel ange-  
gebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen**

Bei längerfristiger Lagerung sollte eine Temperatur von 25 °C nicht überschritten werden.

#### **Zusammensetzung**

1 Ampulle zu 1 ml enthält: Wirkstoff: wässr. Auszug aus *Kalanchoe pinnata*, Folium rec.  
(Pflanze zu Auszugsmittel = 1:1,1) 0,1 g.

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

#### **Darreichungsform und Packungsgröße**

8 Ampullen zu 1 ml Injektionslösung

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: [dialog@weleda.de](mailto:dialog@weleda.de)

**Stand der Information:** März 2014

