

## Regenaplex Haut-Fluid-G

Homöopathisches Arzneimittel

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Mischung / Zum Auftragen auf die Haut

10,0 ml des Arzneimittels enthalten folgende Wirkstoffe:

Arctium Dil. D 3	1,00 ml
Arnica montana Dil. D 6	1,00 ml
Echinacea Dil. D 4	1,00 ml
Euphorbia palustris e herba rec. Dil. D 4 (HAB, Vorschrift 3a)	1,00 ml
Juglans regia (HAB 34) Dil. D 3 (HAB, Vorschrift 3a)	1,00 ml
Levisticum officinale e rad. rec. Dil. D 3 (HAB, Vorschrift 3a)	1,00 ml
Rhus toxicodendron Dil. D 8	1,00 ml
Sulfur Dil. D 6	1,00 ml
Trigonella foenum - graecum Dil. D 3	1,00 ml
Viola tricolor Dil. D 6	1,00 ml

Hergestellt nach HAB Vorschrift 40a

**1 ml entspricht 48 Tropfen:**

**Apothekenpflichtig**

**Inhalt 100 ml**

**Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.**

**Reg.-Nr.: 2522272.00.00**

**Pharmazentralnummer – PZN: 03110947**

Enthält 50 Vol.-% Alkohol

**Vor Gebrauch schütteln!**

**Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.**

In der Originalpackung dicht verschlossen aufbewahren.

Pharmazeutischer Unternehmer: REGENAPLEX GmbH Homöopathische Komplexmittel,  
Robert-Bosch-str. 3, 78467 Konstanz

Hersteller: REGENA AG, Poststr. 32-36, CH-8274 Tägerwilen

### **Gebrauchsinformation:**

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Regenaplex Haut-Fluid-G vorschriftsmäßig angewendet werden.

#### **Was müssen Sie vor der Anwendung von Regenaplex Haut-Fluid-G beachten?**

Regenaplex Haut-Fluid-G darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Arctium (Klette), Arnica montana (Bergwohlverleih), Echinacea (Sonnenhut) oder gegen andere Korbblütler.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Regenaplex Haut-Fluid-G ist erforderlich in der Schwangerschaft und Stillzeit.** Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung vorliegen, sollte das Arzneimittel dann nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Wenden Sie Regenaplex Haut-Fluid-G auch bei Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt an,** da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln** sind keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

#### **Wie ist Regenaplex Haut-Fluid-G anzuwenden?**

Soweit nicht anders verordnet, tragen Sie Regenaplex Haut-Fluid-G 2-3 mal täglich auf die betroffenen Hautbereiche auf.

Reduzieren Sie die Häufigkeit der Anwendung bei Besserung der Beschwerden.

Hinweis: Das Arzneimittel ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Der Kontakt mit den Augen und Schleimhäuten sowie offenen Wunden soll vermieden werden.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einigen Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Es wurde über lokale allergische Reaktionen (Entzündungen der Haut) berichtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen. Bei längerer Anwendung sollte auf UV-Bestrahlung sowie intensives Sonnenbaden verzichtet werden.

Hinweis:

Bei der Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich vorhandene Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Stand der Information: 05/2018**