

# Ethanol 80% (V/V)

vergällt mit Butan-2-on (Ethylmethylketon)

## Lösung zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen Händedesinfektionsmittel

Zul.- Nr. 2109.98.99

### Gebrauchsinformation

**Anwendungsgebiete:** Hygienische Händedesinfektion, Kühllumschläge.

**Gegenanzeigen:** Mit Butan-2-on (Ethylmethylketon) vergälltes Ethanol ist nicht zur Desinfektion großflächiger, offener Wunden geeignet.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

**Warnhinweise:** siehe Rückseite.

**Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:** Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feuchtgehalten. Für Kühllumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

**Hinweise:** Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Ethanol 80% (V/V), vergällt mit Butan-2-on (Ethylmethylketon) wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet. Bei Fragen zur Anwendung bitte Arzt oder Apotheker befragen.

**Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit Ethanol 80% (V/V), vergällt mit Butan-2-on (Ethylmethylketon) können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

**B | BRAUN**

s. Rückseite →

2015-07-13 - 836323



Leicht  
entzündlich

Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen!

Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B.: das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften

des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. 19°C Flammpunkt. Nur zur äußeren Anwendung.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

### Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Nach dem Verfalldatum (siehe unten) nicht mehr verwenden!

**100 g Lösung enthalten:** 77.6 g Ethanol 96% (V/V) vergällt mit Butan-2-on, Gereinigtes Wasser

**Letzte Überarbeitung 07/2015**

# B | BRAUN

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

**B. Braun Melsungen AG**

D-34209 Melsungen

Tel. 05661-710

**500ml Lösung**

Art.-Nr.: **18771**

PZN 03478854

Verwendbar

bis:

Ch.-B:

2015-07-13 - 836324

